

情報数学

中山クラス

小テスト予想問題
解答例

質問がある場合は

nakayama@t.kanazawa-u.ac.jp

までメールしてください。

PC, 携帯, スマホなど, 何からでもOKです.

問題1(pp.23, 定理2.12)

次式において, x^7 の係数を求めよ.

$$(1 + x)^{10}$$

＜解答例＞

二項定理より x^7 の係数は ${}_{10}C_7$ である.

$${}_{10}C_7 = \frac{10!}{(10 - 7)! 7!} = \frac{10!}{3! 7!} = 120$$

問題2(p.25, 定理2.13)

次の値を求めよ. 但し, 答えは指数(べき乗)の形で良い.

$${}_5C_0 + {}_5C_1 + {}_5C_2 + {}_5C_3 + {}_5C_4 + {}_5C_5$$

＜解答例＞

定理2.13において, $n = 5$ の場合に相当する.

$${}_5C_0 + {}_5C_1 + {}_5C_2 + {}_5C_3 + {}_5C_4 + {}_5C_5 = 2^5 = 32$$

問題3(p.25)

5個の異なる物から0個, 2個, 4個取り出す組合せの総和と1個, 3個, 5個取り出す組合せの総和を求め, それらが等しいことを示せ.

<解答例>

$$\text{前者} = {}_5 C_0 + {}_5 C_2 + {}_5 C_4 = 1 + 10 + 5 = 16$$

$$\text{後者} = {}_5 C_1 + {}_5 C_3 + {}_5 C_5 = 5 + 10 + 1 = 16$$

以上より, 前者=後者が成り立つ.

問題4(p.26-定理2.15, p.27-例2.12)

赤いボール3個, 青いボール4個, 黄色いボール2個を全て並べる順列の数を求めよ.

<解答例>

定理2.15の条件と同じであるから,

$$\binom{9}{3,4,2} = \frac{9!}{3! 4! 2!} = 1260$$

問題5(p.28, 例2.13)

赤いボール3個, 青いボール2個, 黄色いボール1個から5個選んで作る順列の数を求めよ.

<解答例>

全てのボールを使用しない場合であり, 5個の構成を分けて定理2.15を適用する.

<5個の構成>

①赤3個 + 青2個

②赤3個 + 青1個 + 黄色1個

③赤2個 + 青2個 + 黄色1個

$$\begin{aligned} \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} &= \binom{5}{3,2} + \binom{5}{3,1,1} + \binom{5}{2,2,1} \\ &= \frac{5!}{3! 2!} + \frac{5!}{3! 1! 1!} + \frac{5!}{2! 2! 1!} = 10 + 20 + 30 = 60 \end{aligned}$$

問題6(p.28, 系2.1)

赤いボール4個, 青いボール3個, 黄色いボール2個を9個の異なる箱にそれぞれ1個ずつ入れる方法は何通りあるか.

<解答例>

系2.1の条件と同じである.

$$n_1 = 4, n_2 = 3, n_3 = 2$$

$n = n_1 + n_2 + n_3 = 9$ に相当する.

$$\binom{9}{4,3,2} = \frac{9!}{4! 3! 2!} = 1260$$

問題7(pp.30-31, 例2.15)

$(1 + x + x^3 + x^5)^4$ を展開して出来る多項式において, x^8 の係数を求めよ.

<解答例1>

x^8 の構成(方針: 低次の項を多く使用 → 高次の項を使用)

① $x \times x \times x \times x^5 \rightarrow {}_4C_3 \times_1 C_1 = 4$

② $x \times x \times x^3 \times x^3 \rightarrow {}_4C_2 \times_2 C_2 = 6$

③ $x^3 \times x^5 \times 1 \times 1 \rightarrow {}_4C_1 \times_3 C_1 \times_2 C_2 = 12$

x^8 の係数 = $4 + 6 + 12 = 22$

<解答例2>

$v = x, w = x^3, y = x^5, z = 1$ とおく.

① v^3y^1 の係数 = $\binom{4}{3,1} = \frac{4!}{3!1!} = 4$

② v^2w^2 の係数 = $\binom{4}{2,2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$

③ $w^1y^1z^2$ の係数 = $\binom{4}{1,1,2} = \frac{4!}{1!1!2!} = 12$

x^8 の係数 = $4 + 6 + 12 = 22$

問題8(pp.10-11, 例2.9)

次の図は道路マップを表している。進む方向は右方向(→)と上方(↑)のみである。以下の間に答えよ。

- (1) A点からB点に行く経路は何通りあるか。
- (2) X印の道路を通らない場合は何通りになるか。
- (3) ○印の道路を必ず通る場合は何通りになるか。


<解答例>

(1) 右方向→が5個、上方向↑が3個の合計8個ある。

(例) →↑→→↑→→↑

A点からB点に行く経路の総数は8個の位置(順番)から3(5)個を選んで↑(→)に割り当てる組合せの数に等しい。

$${}_8C_3 = {}_8C_5 = 56 \text{通り}$$



(2) X印の道を必ず通る経路の数を求め、これを総数より差し引く。
A点→X印の間には右向き→が3個、上向き↑が1個入る。X印→B点の間には右向き→が2個、上向き↑が1個入る。

- ①(A点→X印の道)の経路の数=4個の位置(順番)から1(3)個選んで↑(→)に割り当てる組合せの数= $_4 C_1 = _4 C_3 = 4$
- ②(X印の道→B点)の経路の数=3個の位置(順番)から1(2)個を選んで↑(→)に割り当てる場合の数= $_3 C_1 = _3 C_2 = 3$
- ③X印の道を必ず通る経路の数=①×②= $4 \times 3 = 12$

X印の道を通らない経路の数=総数-③= $56 - 12 = 44$ 通り

(3) 上記の③を求める方法と同じである。

A点→○印の間には右向き→が1個、上向き↑が2個入る。○印→B点の間には右向き→が3個、上向き↑が1個入る。

- ①(A点→○印の道)の経路の数=3個の位置(順番)から2(1)個選んで↑(→)に割り当てる組合せの数= $_3 C_2 = _3 C_1 = 3$
- ②(○印の道→B点)の経路の数=4個の位置(順番)から1(3)個を選んで↑(→)に割り当てる場合の数= $_4 C_1 = _4 C_3 = 4$
- ③○印の道を必ず通る経路の数=①×②= $3 \times 4 = 12$ 通り

問題9(p.6)

男子4人と女子2人を1列に並べるとき、次の間に答えよ。

- (1)全部の並べ方は何通りあるか。
- (2)女子2人が隣り合う並べ方は何通りあるか。
- (3)女子2人が隣り合わない並べ方は何通りあるか。

<解答例>

- (1)異なる6人から6人を選んで作る順列の数に等しい。

$${}_6P_6 = 6! = 720\text{通り}$$

- (2)女子2人をまとめて1組とする。

男子4人 + 女子1組みの順列 = (異なる5人から5人を選んで作る順列の数) × (女子2人の順列の数)

$${}_5P_5 \times {}_2P_2 = 5! \times 2! = 240\text{通り}$$

- (3)(1)の結果 - (2)の結果として求まる。

$$720 - 240 = 480\text{通り}$$

問題10(pp.20-21)

3種類の菓子で合計8個入りの菓子折りを作る.

(1)何通りの作り方があるか.

(2)3種類から少なくとも1個は入れるとすると、何通りになるか.

<解答例>

(1)3種類の異なる物から重複を許して8個取って作る組合せの数に等しい.

$${}_3H_8 = {}_{3+8-1}C_8 = {}_{10}C_8 = \frac{10!}{2! 8!} = 45$$

(2)条件を満たすために、3種類の菓子から1個ずつ選んで菓子折に入れる。そうすると、問題は次のようになる「3種類の異なる物から重複を許して5個取って作る組合せの数」

$${}_3H_5 = {}_{3+5-1}C_5 = {}_7C_5 = \frac{7!}{2! 5!} = 21$$

問題11(pp.20-21)

3つの変数からなる次の1次方程式を考える.

$$x + y + z = 6$$

(1) 負でない整数解の組は何通りあるか.

(解の例) $x = 1, y = 3, z = 2$, $x = 0, y = 5, z = 1$

(2) 正の整数解は何通りあるか. (解として0は含まない)

<解答例>

(1) $x = 1, y = 3, z = 2$ は x を1個, y を3個, z を2個選んだと考える. $x = 0, y = 5, z = 1$ も同様に x を0個, y を5個, z を1個選んだと考える → 負でない整数解の組の数 = 3種類の異なる物から重複を許して6個とる組合せの数

$${}_3H_6 = {}_{3+6-1}C_6 = {}_8C_6 = \frac{8!}{2! 6!} = 28$$

(2) 重複組合せは0個選ぶことも可能なので、まず、3種類 x, y, z から1個ずつ選ぶ. そうすると、求めるべきものは「3種類の異なる物から重複を許して3個とる組合せの数」となる.

$${}_3H_3 = {}_{3+3-1}C_3 = {}_5C_3 = \frac{5!}{2! 3!} = 10$$

問題12(p.32)

異なる物を異なる箱に入れる問題において、各箱に入る物を高々1個に制限する場合、以下の間に答えよ。

- (1) 3個の異なる物を5個の異なる箱に入れる場合、何通りの方法があるか。
- (2) 5個の異なる物を3個の異なる箱に入れる場合、何通りの方法があるか。

<解答例>

p.32の「1. の問題で各箱に入れる物をたかだか1個に制限する場合」に該当する。

- (1) 箱の数 $n = 5 >$ 物の数 $r = 3$ であるから

$${}_n P_r = {}_5 P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{通り}$$

- (2) 箱の数 $n = 3 <$ 物の数 $r = 5$ であるから

$${}_r P_n = {}_5 P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{通り}$$

問題13(p.33)

異なる5個の物を異なる3個の箱に入れる問題において、各箱に入れる物の数を制限しない場合、以下の間に答えよ。

- (1) 箱内の物の順序を考えない場合、何通りの方法があるか。
- (2) 箱内の物の順序を考える場合、何通りの方法があるか。

＜解答例＞

(1) p.33の「1. の問題で各箱に入れる物の数を制限せず、箱内の物の順番を考えない場合」に該当する。

$${}_n\Pi_r = {}_3\Pi_5 = 3^5 = 243$$

(2) p.33の「1. の問題で各箱に入れる物の数を制限せず、箱内の物の順番を考える場合」に該当する。

$$\frac{(n+r-1)!}{(n-1)!} = \frac{(3+5-1)!}{(3-1)!} = \frac{7!}{2!} = 2520$$

問題14(pp.34-35)

同じ種類の5個の物を異なる3個の箱に入れる問題において、以下の間に答えよ。

- (1) 各箱に入る物を高々1個に制限する場合、何通りあるか。
- (2) 各箱に入る物の数を制限しない場合、何通りあるか。
- (3) 各箱に入る物の数を少なくとも1個とする場合、何通りあるか。

<解答例>

(1) p.34の「2. の問題で各箱に入る物を高々1個に制限する場合」に該当する。この問題では、同種の物の数 $r = 5$ > 箱の数 $n = 3$ であるため、3個の箱に1個ずつ入れる1通りの入れ方しかない。

(2) p.34の「2. の問題で各箱に入る物の数を制限しない場合」に該当する。

$${}_n H_r = {}_3 H_5 = {}_{3+5-1} C_5 = {}_7 C_5 = \frac{7!}{2! 5!} = 21$$

(3) p.35の「2. の問題で各箱に入る物の数を少なくとも1個とする場合」に該当する。

$${}_n H_{r-n} = {}_{r-1} C_{n-1} = {}_4 C_2 = \frac{4!}{2! 2!} = 6$$

問題15(pp.7-8)

6人が円形テーブルのまわりに並べられた6個の座席に座る場合の座り方の数を求めよ.

<解答例>

最初の1人が座るとき, 全ての座席は全く同等なので, 1通りの座り方しかない. 2人目以降は最初に座った人が身印となって, 残り全ての座席に順番を着けたのと同じになるので, 残りの人気が座る方法は $n - 1$ 個の物を全て使って作る順列の数になる.

$${}_{n-1}P_{n-1} = (n - 1)! = 5! = 120 \text{通り}$$

問題16(pp.16-17)

パスカルの三角形において以下の間に答えよ.

- (1) $[x]$, $x=a, b, c, d, e, f$ に入る ${}_n C_r$ を求めよ.
(n, r を求める).

- (2) $[x]$, $x=a, b, c, d, e, f$ に入る数字を求めよ.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & [a] & & 1 & \\ 1 & & [b] & & [c] & & 1 \\ 1 & & [d] & & [e] & & [f] & 1 \end{array}$$

<解答例>

(1) n は上から $n = 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$, r は左から $r = 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$ となる. $[a]_2 C_1, [b]_3 C_1, [c]_3 C_2, [d]_4 C_1, [e]_4 C_2, [f]_4 C_3$

(2) ある場所の数値は、その左上と右上にある数値の和として求まる. $[a] = 1 + 1 = 2, [b] = 1 + 2 = 3, [c] = 2 + 1 = 3, [d] = 1 + 3 = 4, [e] = 3 + 3 = 6, [f] = 3 + 1 = 4$